



NEW КС ВЕЛАС



Локально-системний препарат, що ефективно контролює грибкові та бактеріальні захворювання томатів, капусти та яблунь протягом вегетаційного періоду

Переваги

- Висока ефективність у боротьбі проти бактеріальних хвороб.
- Відсутність фітотоксичної дії

Характеристики

Вміст діючої речовини	продукт ферментації гриба <i>Streptomyces kasugaensis</i> , 60 г/л
Хімічна група	ферменти
Препаративна форма	розчинний концентрат
Класифікація ВООЗ	IV клас

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування	Внесення препарату необхідно проводити при оптимальній температурі +15°C-25°C
Сумісність	Для посилення захисту рослин від грибкових хвороб та подовження періоду захисту від бактеріозів, цей препарат рекомендується застосовувати в бакових сумішах з препаратами, які містять мідь
Вимоги до рН робочого розчину	4
Застереження у застосуванні	Рекомендується застосовувати не більше трьох разів
Норма витрати робочого розчину	для польових культур - 200-400 л/га, для саду - 600-800 л/га

Механізм дії

Препарат легко проникає в тканини рослин і швидко розподіляється по них. Це дозволяє йому досягати місць ураження та діяти безпосередньо на збудників хвороби.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, л / га	Максимальна кількість обробок
Томат	Церкоспороз, бактеріальна плямистість, септоріоз, слизистий бактеріоз, бактеріальні опіки	Обприскування в період вегетації	0,8-1,6	3
Капуста	Септоріоз, слизистий бактеріоз, бактеріальні опіки			
Яблуня	Антракноз, септоріоз, слизистий бактеріоз, парша, бактеріальні опіки			
Соя	Бактеріальне в'янення, пустульна плямистість, бактеріальний опік, септоріоз, фузаріоз			
Соняшник	Бактеріальний опік, бактеріальна гниль кошиків, стебел, бактеріальна плямистість листя			
Пшениця	Базальний бактеріоз, чорний плямистий бактеріоз,			
Ріпак	Бактеріоз коренів, бактеріальне в'янення			
Ягідні культури	Бактеріальний опік, бактеріальне в'янення, м'яка гниль			

