



NEW

ТАЛЕР МАКС



Високоєфективний системний фунгіцид для захисту від комплексу збудників хвороб з рістрегулюючими властивостями.

Переваги

- Швидке проникнення в рослину.
- Добре виражений «стоп-ефект».
- Проявляє ріст-регулюючу дію на ріпак.
- Забезпечує захисну і лікувальну дію.
- Відмінний контроль фузаріозу колоса.

Характеристики

Вміст діючої речовини **тебуконазол, 500 г/л**

Хімічна група **триазоли**

Препаративна форма **концентрат суспензії**

Класифікація ВООЗ **III клас**

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування

Фунгіцид застосовується в період вегетації профілактично або при перших симптомах прояву інфекції. Обробку доцільно проводити за температури в межах +10°C - +25°C..

Сумісність

Сумісний з іншими продуктами. Але в будь-якому випадку перед застосуванням рекомендується провести попередній тест на змішуваність.

Вимоги до рН робочого розчину

від 5 до 8

Застереження у застосуванні

У разі порушення регламенту застосування можливе зниження ефективності продукту.

Норма витрати робочого розчину

200-400 л/га

Механізм дії

Тебуконазол інгібує біосинтез ергостерону в клітинах гриба, що призводить до руйнації клітинних стінок патогена, зупинки росту міцелію та його швидкої загибелі.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, л / га	Максимальна кількість обробок
Пшениця	Іржа (бура, стеблова, жовта), септоріоз, фузаріоз колоса	Обприскування в період вегетації	0,25-0,6	2
Соя	Альтернаріоз, склеротиніоз, іржа		0,25-0,6	
Ріпак	Альтернаріоз, циліндроспоріоз, фомоз		0,25-0,6	
Ріпак	Для припинення активного наростання наземної маси, накопичення пластичних речовин та прискорення зростання кореневої системи восени	Обприскування у фазу 3-5 листків культури	0,25-0,6	1

