



Регулятор росту для запобігання вилягання культури



Переваги

- Запобігає виляганням культури.
- Стимулює ріст кореневої системи.
- Підвищує стійкість рослин до посухи.

Характеристики

Вміст діючої речовини **тринексапак-етил, 250 г/л**

Хімічна група **циклогександіони**

Препаративна форма **концентрат емульсії**

Класифікація ВООЗ **III клас**

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування

Для посилення рістрегуляції озимого ріпаку рекомендується сумісне внесення з препаратами Талер, Талер Макс та Камзол, Камзол Турбо, що також забезпечує і тривалий фунгіцидний захист. Важливо уникати обприскування рослин, які знаходяться в стресі (в т.ч. гербіцидному), мокрі від роси або дощу, а також у разі очікування опадів протягом наступних 6 годин.

Сумісність

Не рекомендується використовувати в бакових сумішах з гормональними ЗЗР.

Застереження у застосуванні

Не рекомендується застосовувати препарат у стресових умовах розвитку культури.

Вимоги до рН робочого розчину

від 5 до 7

Норма витрати робочого розчину

200-300 л/га

Механізм дії

Тринексапак-етил діє шляхом блокування синтезу гіберелінів – фітогормонів росту. Це призводить до зменшення довжини міжвузлів, потовщення стебла та посилення розвитку кореневої системи.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Призначення	Фаза внесення	Норми витрати, л/га	Кількість обробок
Пшениця озима	Інгібування росту рослин, підвищення врожайності	Обприскування від фази кушення до появи прапорцевого листка	0,4-0,6	1
Пшениця яра		Обприскування від фази кушення до кінця трубкування		1
Ячмінь озимий		Обприскування від фази кушення до появи прапорцевого листка	0,6-0,8	1
Ячмінь ярий		Обприскування від фази кушення до кінця трубкування		1
Соняшник	Запобігання вилягання посівів та підвищення врожайності	Обприскування під час вегетації, фаза 6-10 листків	0,3-0,6	2
Озимий ріпак	Рістрегуляція та підвищення стійкості до екстремальних погодних умов	В осінній період у фазу 4-6 листків	0,3-0,6	1

