



Системний препарат для профілактики та лікування грибкових захворювань у зернових, бобових, олійних культур та цукрових буряків.

Переваги

- Надійний захист від багатьох хвороб.
- Забезпечує посухостійкість.
- Збереження ефективності під впливом сонячного світла і тривалий захисний період.
- Оптимізація умов вирощування для продовження вегетаційного циклу культури для підвищення врожайності.

Характеристики

Вміст діючої речовини	азоксистробін, 200 г/л + ципроконазол, 80 г/л
Хімічна група	триазоли, стробілурини
Препаративна форма	концентрат суспензії
Класифікація ВООЗ	III клас

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування	Рекомендується застосовувати препарат на початкових стадіях розвитку хвороби, оптимальна температура для використання: від +12°C до 25°C.
Сумісність	Сумісний із більшістю засобів захисту рослин.
Вимоги до рН робочого розчину	від 5 до 8
Застереження у застосуванні	Оптимальні години для внесення препарату в ранкові з 6 до 9 та в вечірні з 19 до 22 .
Норма витрати робочого розчину	200-300 л/га

Механізм дії

Препарат системно розподіляється по рослині, рухаючись як вгору по стеблу, так і всередину листової пластини. Ципроконазол зупиняє розвиток грибів, через півгодини після обприскування. Азоксистробін порушує енергетичний обмін в клітині гриба, блокуючи дихальний ланцюг.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, л / га	Максимальна кількість обробок
Буряки цукрові	Церкоспороз, борошниста роса, пероноспороз	Обприскування в період вегетації	0,5-0,75	2
Пшениця	Септоріоз, борошниста роса, бура листовка іржа, фузаріоз і септоріоз колосу, альтернаріоз		0,5-0,75	
Ріпак	Фомоз, альтернаріоз, біла й сіра гнилі, пероноспороз		0,75–1,0	
Соняшник	Фомоз, альтернаріоз, фомопсис, іржа, пероноспороз, борошниста роса		0,5-0,75	
Соя	Пероноспороз, борошниста роса, фузаріоз, іржа		0,5–0,75	
Ячмінь	Борошниста роса, сітчаста, смугаста, облямівкова плямистості, септоріоз		0,5-0,75	

