



ГЕРБІЦИД

ПАЛДІС, ВГ

темботріон, 200 г/кг

ПРИЗНАЧЕННЯ

післясходовий системний гербіцид для контролю широкого спектру однорічних дводольних та злакових бур'янів у посівах кукурудзи. Препарат порушує процес фотосинтезу в рослинах бур'янів, що призводить до їх знебарвлення і швидкої загибелі.

ПАКУВАННЯ: полімерні ємкості вагою 1,0 кг

СПЕКТР ДІЇ

ДВОДОЛЬНІ БУР'ЯНИ

ЧУТЛИВІ

Амброзія полинолиста
Галінсога дрібноквітова
Гірчак березковидний*
Гірчак звичайний
Гірчак почечуйний
Гірчак шорсткий
Гірчиця польова
Глуха кропива пурпурова
Дурман звичайний
Зірочник середній
Канатник Теофраста
Коноплі звичайні
Лобода, види
Лутига розлога
Нетреба, види
Осот польовий
Падалиця соняшнику, види
Паслін чорний
Переліска однорічна
Підмаренник чіпкий
Редька дика
Ромашка лікарська
Щириця загнута
Щириця лободовидна

СЕРЕДНЬОЧУТЛИВІ

Берізка польова
(з насінини)
Ваточник сирійський
Хвощ польовий

МАЛОЧУТЛИВІ

Берізка польова
(з кореневища)
Гібіск трійчастий
Портулак городній

* — Оптимальна фаза застосування 1–3 листки.

ОДНОДОЛЬНІ ЗЛАКОВІ БУР'ЯНИ

ЧУТЛИВІ

Вівсюг звичайний
Мишій зелений
Мишій кільчастий
Мишій сизий
Пальчатка кровоспинна
Плоскуха звичайна
Просо звичайне

МАЛОЧУТЛИВІ

Гумай (сорго алепське)
Падалиця пшениці
Пирій повзучий
Свинорій пальчастий
(пальчатка зубата)

ПЕРЕВАГИ

- **Надійний контроль падалиці соняшнику (традиційного, Clearfield та Express Sun) і падалиці ріпаку**
- **Відмінний контроль лободи білої, амброзії, щириці, проса курячого.**
- **Широке вікно застосування.**
- **Безпечний для використання в бакових сумішах.**

Сумісність з іншими препаратами: продукт сумісний з іншими препаратами. Але в будь-якому випадку перед застосуванням рекомендується провести попередній тест на змішуваність.

Приготування та норма витрати препарату, робочого розчину: перед внесенням необхідно підготувати обладнання для обприскування: перевірити справність систем обприскувача, провести ретельне промивання баку, магістральних трубопроводів та наконечників для розбризкування робочої суміші. Перед роботою відрегулювати обприскувач на завданий режим роботи. Необхідну кількість препарату при ввімкненому режимі розмішування залити в заповнений на 1/3 бак обприскувача, через 15 хвилин долити водою до повного об'єму бака. Продовжуйте перемішування, доки не буде застосована вся суміш. Не залишайте робочий розчин в обприскувачі на тривалий час без перемішування.

Рекомендована норма витрати робочого розчину 200 – 300 л/га.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, кг/га
Кукурудза	Однорічні дводольні та злакові бур'яни	Обприскування рослин у фазі від 2 до 8 видимих листків кукурудзи	0,4-0,5 + Оіл Дріфт 1,0-2,0 л/га

Максимальна кратність обробітку 1

Обприскування проводять при температурі повітря не вище +25°C за швидкості вітру не вище 3 м/сек при дрібнокрапельному і 4 м/сек при крупнокрапельному обприскуванні. Під час внесення робоча швидкість агрегату повинна становити 7-10 км/год.

Препарат є малотоксичним для риб, бджіл, птахів, не чинить негативного впливу на ґрунтову мікрофлору.

ОРГАНІЗАЦІЯ СІВОЗМІНИ

4 місяці

Пшениця озима, ячмінь озимий, ріпак озимий, морква

5 місяців

Тритікале озиме, цибуля, люцерна, капуста

6 місяців

Соняшник, томати

8 місяців

Соя

10 місяців

Горох, ріпак ярий, льон, ячмінь ярий, картопля

18 місяців

Буряки цукрові

***СОЮ, ОЗИМУ ПШЕНИЦЮ ТА ОЗИМИЙ ЯЧМІНЬ ВИСІВАТИ ПІСЛЯ ОРАНКИ АБО ГЛИБОКОЇ КУЛЬТИВАЦІЇ!**