



NEW

РАДИКАЛ ТУРБО



**Локально-системний фунгіцид
захисної та лікувальної дії для
контролю комплексу хвороб**

Переваги

- Поєднання двох діючих речовин різних хімічних класів (триазолінтіон + карбоксамід) з різною мобільністю в рослині забезпечує повноцінний захист листового апарату.
- Поєднує профілактичну, лікувальну та викорінюючу дію — забезпечує тривалий захист посівів.

Характеристики

Вміст діючої речовини	протіоконазол, 225 г/л + боскалід, 250 г/л
Хімічна група	триазолінтіони + карбоксаміди (SDHI-інгібітори)
Препаративна форма	концентрат суспензії (КС)
Класифікація ВООЗ	III клас небезпечності

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування

Обприскування в період вегетації культур, профілактично або за перших ознак прояву хвороби. Обробку проводять за температури повітря не вище +25 °С, у ранкові (до 10:00) або вечірні (18:00–22:00) години, за швидкості вітру не більше 3–4 м/с

Сумісність

Сумісний з іншими препаратами в бакових сумішах; перед застосуванням рекомендовано провести тест на змішуваність

Вимоги до рН робочого розчину

від 6 до 8

Застереження у застосуванні

Дотримуватись обмежень застосування у водо-охоронних зонах навколо водойм.

Норма витрати робочого розчину

200–300 л/га



Механізм дії

Протіоконазол пригнічує біосинтез ергостерину — ключового компонента клітинної мембрани патогена, блокуючи фермент C14-деметилазу, що призводить до руйнування клітинної стінки гриба. Боскалід блокує фермент сукцинатдегідрогеназу в мітохондріях патогена, порушуючи процес клітинного дихання. Поєднання двох механізмів дії забезпечує швидку зупинку розвитку хвороби та тривалий захисний ефект.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза вне-сення	Норми витрати, л / га	Строк очікування, днів	Макс. обробок
Пшениця озима, ячмінь ярий	Борошниста роса, іржа, фузаріоз колосу, септоріоз, смугаста та сітчаста плямистості, піренофороз	Обприску-вання в період вегетації	0,3–0,5	30	1
Ріпак	Альтернаріоз, сіра гниль, біла гниль, фомоз, циліндроспоріоз			30	
Соя	Борошниста роса, іржа, септоріоз			50	
Соняшник	Фомоз, сіра гниль, біла гниль, альтернаріоз, іржа			50	