




БЛЕЙД



Системний післясходовий гермініцид

Переваги

- Швидке проникнення в злакові бур'яни.
- Висока стійкість до змивання опадами.
- Швидкий візуальний ефект дії препарату.
- Знищення як наземної, так і підземної частини злакових бур'янів.

Характеристики

Вміст діючої речовини клетодим, 120 г/л

Хімічна група циклогександіони

Препаративна форма концентрат емульсії

Класифікація ВООЗ III клас

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування

Норму використання продукту встановлюють залежно від фази розвитку бур'янів та ступеня забур'яненості. Обробку доцільно проводити у ранкові години при температурі від +10°C до +25°C.

Сумісність

Не рекомендовано змішувати з фосфорорганічними інсектицидами, гербіцидами проти дводольних бур'янів та добривами.

Вимоги до рН робочого розчину

від 7 до 9

Застереження у застосуванні

Боротьбу із злаковими бур'янами, рекомендуємо провести до фази 6 листків у соняшнику (ВВСН 16), та до появи квіткових бутонів у сої та ріпаку (ВВСН 50)

Норма витрати робочого розчину

200-300 л/га.

Механізм дії

Клетодим при поглинанні листям і стеблами бур'янів, проникає в рослину, концентрується в точках росту і блокує біосинтез ліпідів. У дводольних рослин клетодим включається в обмін речовин та інактивується. Клетодим знищує як надземну, так і підземну (кореневу) частину злаків, запобігаючи відростанню багаторічних видів. Завдяки своїй селективності продукт не викликає фітотоксичності у дводольних культурних рослин, на яких рекомендований до застосування. Дія клетодиму на злакові бур'яни проявляється на 3-5 день у вигляді хлорозу листків та побуріння точок росту, відмирання рослин відбувається через 7-21 день після обробки.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, л/га
Соняшник, соя, ріпак, буряки цукрові	Однорічні злакові бур'яни	Обприскування бур'янів у фазі 2-3 листків	0,4-0,8
Соняшник, соя, ріпак, буряки цукрові	Багаторічні злакові бур'яни (у т.ч. падалиця озимої пшениці)	Обприскування за висоти бур'янів 10-20 см (у т.ч. до фази куцнення падалиці озимої пшениці)	1,4-1,8



Падалиця озимої пшениці у посіві озимого ріпаку



Контроль падалиці озимої пшениці



Дивитись відео про результати роботи продукту

Повернутись до головного змісту

