



ДИКАМБА ФОРТЕ



Післясходовий гербіцид для контролю однорічних та багаторічних дводольних бур'янів

Переваги

- Широкий спектр ефективності.
- Відсутність післядії на наступні культури.

Характеристики

Вміст діючої речовини

2,4-дихлорфеноксиоцетової кислоти диметиламінна сіль 344 г/л + дикамба 120 г/л

Хімічна група

похідні бензойної кислоти + аріалканкарбонової

Препаративна форма

водорозчинний концентрат

Класифікація ВООЗ

III клас

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування

Найвищий рівень ефективності гербіцидної дії досягається при обробці посівів в ранні фази розвитку бур'янів. Зокрема, однорічні бур'яни найкраще знищуються у фазі 2-4 листків; багаторічні – у період їх найбільш чутливої стадії розвитку: для берізки польової це 5-10 см довжини паростків, для осоту рожевого – стадія розетки (4-6 листків).

Сумісність

Сумісний з більшістю продуктів. Однак в кожному конкретному випадку необхідно провести додаткову перевірку продуктів на сумісність

Вимоги до рН робочого розчину

від 5 до 8

Застереження у застосуванні

Не рекомендується застосовувати продукт при пониженні температури нижче +10°C та не у зазначеній фазі розвитку культури.

Норма витрати робочого розчину

200-300 л/га.

Механізм дії

2,4-Д і дикамба належать до синтетичних ауксинів, проникають у рослини через тканини органів та коріння, активно гальмують ріст і поділ клітин, порушують в них білковий та ліпідний обмін, що призводить до загибелі листя та кореневої системи бур'янів. Саме загибель кореневої системи є головним важелем у боротьбі з багаторічними бур'янами.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, л/га	Максимальна кількість обробок
Пшениця озима	Однорічні та деякі багаторічні дводольні бур'яни в т.ч. стійкі до 2,4Д та МЦПА	Обприскування посівів від фази кушення до виходу у трубку	0,8	1
Ярий ячмінь			0,5-0,7	1
Кукурудза		Обприскування посівів у фазі 3-5 листків культури	1,0-1,2	1

Дикамба Форте є оптимальним партнером для бакових сумішей з продуктами на основі гліфосатів в осінній період для боротьби з кореневищними та коренепаростковими бур'янами.

