



КУШОН



Селективний гербіцид системної дії для боротьби з однорічними дводольними та злаковими бур'янами



Вміст діючої речовини

метамітрон,
700 г/л



Хімічна група

триазинони



Препаративна форма

концентрат
суспензії



Класифікація ВООЗ

II клас небезпечний для теплокровних, безпечний для бджіл, птахів, риб

Можливість застосування вже при +5°C.

Застосовується незалежно від фази розвитку культури.

Довготривала захисна дія.

Ефективність не зменшується, навіть якщо одразу після обприскування пройде дощ – змита речовина подіє через ґрунт.

Механізм дії

Метамітрон поглинається корінням та листками бур'янів, швидко переміщується до листового апарату рослини, де блокує процес фотосинтезу, що призводить до загибелі рослин бур'янів.



Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Шкочинний об'єкт	Фаза внесення	Норми витрати препарату	Кількість обробок
Буряки цукрові	Однорічні дводольні та деякі злакові бур'яни	Перше обприскування у фазі сім'ядоль бур'янів, наступні з інтервалом 7-10 днів	1,0-2,0 л/га	3

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування	Норма витрати робочого розчину	Сумісність	Застереження у застосуванні
При післясходовому застосуванні, для отримання максимального результату, обробку слід проводити в оптимальному температурному режимі (від +5°C до +25°C).	200-300 л/га	Продукт сумісний з іншими препаратами. Але в будь-якому випадку перед застосуванням рекомендується провести попередній тест на змішуваність.	Не застосовувати пізніше зазначеного у таблиці строку останньої обробки до збирання врожаю. Сумарне використання препарату не повинне перевищувати 6 л/га на сезон.