



РИМ



Селективний післясходовий гербіцид для захисту від злакових та деяких дводольних бур'янів



Переваги

- Не загрожує культурі завдяки швидкому розпаду в рослинах кукурудзи.
- Має широкий спектр дії та низьку норму витрати.
- Відмінний партнер у бакових сумішах.
- Не загрожує забрудненням ґрунтовим водам, що дає змогу застосовувати препарат навіть у водоохоронних зонах.

Характеристики

Вміст діючої речовини **римсульфурон, 250 г/кг**

Хімічна група **сульфонілсечовини**

Препаративна форма **водорозчинні гранули**

Класифікація ВООЗ **III клас**

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування

Не має обмежень у сівозміні. Для ефективного контролю багаторічних злакових бур'янів обробіток слід проводити за висоти 10-15 см.

Сумісність

При використанні у баковій суміші рекомендовано проводити пробне змішування.

Вимоги до рН робочого розчину

від 5 до 7

Застереження у застосуванні

Не бажано використовувати продукт при температурі нижче +10°C і вище +25°C. Заборонено використовувати на полях кукурудзи протягом 7-10 днів до чи після обробки фосфорорганічними інсектицидами.

Норма витрати робочого розчину

200-300 л/га

Механізм дії

Римсульфурон пригнічує поділ клітин в точках росту пагонів і коріння в чутливих бур'янів. Поглинання здійснюється головним чином листям. Поглинання через кореневу систему залежить від вологості ґрунту і обмежене за часом.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, г/га
Кукурудза	Однорічні та багаторічні злакові і деякі дводольні бур'яни	Обприскування з фази 3-х до фази 7-ми листків у культури (ВВСН 13-17)	40-50 + ПАР Мачо



Рим 40 г/га + Мачо 0,2 л/га на 10-й день після внесення

Для розширення спектру контрольованих бур'янів рекомендовано використовувати у бакових сумішах: Ефімер або Дикамба-Форте або Примус.



Дивитись відео про результати роботи продукту

Повернутись до головного змісту

