



## СУМАРО



Селективний системний післясходовий гербицид для контролю однорічних та багаторічних дводольних бур'янів.



**Вміст діючої речовини**  
мезотріон,  
480 г/л



**Хімічна група**  
трикетони



**Препаративна форма**  
концентрат суспензії



**Класифікація ВООЗ**  
III клас  
(помірно небезпечний)



Ефективна дія проти однорічних та багаторічних дводольних бур'янів.



Відсутність фітотоксичного впливу на культуру.



Швидка та пролонгована дія, що запобігає появі наступних хвиль бур'янів.




Може використовуватися на різних стадіях розвитку культури і бур'янів.

### Механізм дії

Мезотріон блокує дію важливого рослинного ензиму та запобігає формуванню каротиноїдів у рослин бур'янів. Без каротиноїдів світлова енергія та побічні продукти фотосинтезу руйнують хлорофіл та клітинні мембрани. У результаті відбувається швидке знебарвлення листків, слідом – некроз та загибель бур'янів. Діюча речовина мезотріон швидко проникає у рослину через листя, корені та пагони, і спричинює зупинку росту чутливих бур'янів протягом 1-2 днів після застосування та повне їх знищення протягом 2-х тижнів.



## Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Шкодочинний об'єкт	Фаза внесення	Норми витрати препарату, л/га	Кратність обробок
 Кукурудза	Однорічні та багаторічні дводольні бур'яни	Обприскування у фазу 3-8 листків культури	0,25 л/га + 0,25 л/га ПАР	1

## Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування	Норма витрати робочого розчину	Сумісність	Застереження у застосуванні
Обприскування слід проводити при температурі повітря в межах від +8°C до +25°C.	200-300 л/га	Препарат можна використовувати в бакових сумішах з більшістю пестицидів, однак перед цим необхідно провести пробне змішування.	Наступного року після застосування препарату не рекомендується вирощувати цукровий буряк, горох, нут та овочі. Сою, соняшник та ріпак рекомендовано висівати після оранки, кукурудзу, сорго, пшеницю, ячмінь — без обмежень.