



БОМБАРДИР



Системний інсектицид контактно-кишкової дії проти широкого спектру шкідників з тривалим періодом захисту

Переваги

- Швидка загибель шкідників недовзі після застосування.
- Захист молодих пагонів та листя, які відростають уже після обробки.

Характеристики

Вміст діючої речовини імідаклоприд, 700 г/кг

Хімічна група неоніотиноїди

Препаративна форма водорозчинні гранули

Класифікація ВООЗ III клас

Рекомендації щодо застосування**Особливості застосування**

Обробку проводять у випадку, коли чисельність шкідників перевищує економічний поріг шкодочинності. Рівномірне покриття рослин робочим розчином є однією з основних вимог. Оптимальна температура застосування + 15°C – + 25°C

Сумісність

Продукт можна застосовувати в сумішах з іншими засобами захисту рослин. Але в будь-якому випадку перед застосуванням рекомендується провести попередній тест на змішуваність.

Застереження у застосуванні

Не рекомендується застосовувати в період цвітіння.
Не змішувати з продуктами, які мають лужну реакцію.

Вимоги до рН робочого розчину

від 5 до 7

Норма витрати робочого розчину

Для польових культур – 200-300 л/га,
для садів та виноградників – 800-1000 л/га

Механізм дії

Імідаклоприд завдяки своїм контактно-кишковим властивостям, викликає ураження нервової системи дорослих комах та їх личинок, подразнення їх рецепторів, конвульсії та швидку загибель. Імідаклоприд проникає в усі частини рослини через листя, стебла, коріння та переноситься по них акропетально. Імідаклоприд діє як антагоніст постсинаптичних нікотинінових рецепторів, з подальшим руйнуванням центральної нервової системи комах, внаслідок чого шкідники гинуть. При відносно низьких нормах застосування стримує чисельність комах впродовж тривалого періоду (в більшості випадків достатньо однієї обробки за сезон).

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, кг/га	Максимальна кількість обробок	Строк останньої обробки до збирання врожаю
Картопля	Колорадський жук	Обприскування в період вегетації	0,045-0,050	1	20
Томати, баклажани					15
Озима пшениця	Злакові попелиці, клоп-черепашка, п'явиці, трипси		0,045-0,050	1	30
Яблуна, груша	Плодожерки, листовійки, попелиці		0,07	1	30
Соняшник	Совки, попелиці		0,045-0,060	1	30

