



# МЕЦЕНАТ



## Системний фунгіцид для захисту від комплексу хвороб листя

### Переваги

- Широкий спектр фунгіцидної дії.
- Володіє високою фунгіцидною активністю проти збудників септоріозу листя, іржі та борошнистої роси.
- Має лікувальну та захисну дію.

### Характеристики

Вміст діючої речовини **пропіконазол, 250 г/л**

Хімічна група **триазоли**

Препаративна форма **концентрат емульсії**

Класифікація ВООЗ **III клас**

### Рекомендації щодо застосування

#### Особливості застосування

Продукт максимально ефективний при проведенні обробок профілактично або при появі перших ознак розвитку хвороб.

#### Сумісність

Сумісний з іншими продуктами. Перед застосуванням рекомендується провести попередній тест на змішуваність.

#### Вимоги до рН робочого розчину

від 6 до 8

#### Застереження у застосуванні

У разі порушення регламенту застосування можливе зниження ефективності продукту.

#### Норма витрати робочого розчину

200-300 л/га

### Механізм дії

Пропіконазол потрапляє на рослину і переміщується акропетально. Він володіє тривалою захисною та лікувальною дією проти збудників хвороб, припиняє їх подальший розвиток і пригнічує у них спороутворення. Дія продукту починає проявлятися через 2-3 години після обробки. Проти борошнистої роси він активний протягом 3-4 тижнів, іржі – 4-5 тижнів, в умовах епіфітотій – до 2-х тижнів.

### Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, л / га	Максимальна кількість обробок
Пшениця	Борошниста роса, іржа (види), септоріоз листя і колосу, плямистості	Обприскування в період вегетації	0,5	2
Ячмінь				2
Соняшник	Іржа		0,5	2
Цукрові буряки	Церкоспороз, борошниста роса		0,5	2
Соя	Іржа, борошниста роса, антраканоз, альтернаріоз		0,5-0,7	2

Для досягнення найвищої ефективності у контролі хвороб рекомендується використання у баковій суміші з Абсолютом або Сальто.

