

АБСОЛЮТ



Локально системний фунгіцид для захисту проти грибкових захворювань

Переваги

- Відмінний контроль грибкових захворювань за найрізноманітніших кліматичних умов
- Має потужний «стоп-ефект», особливо на ранніх етапах розвитку патогенів.
- Традиційний компонент комплексних систем захисту рослин.
- Запобігає проникненню інфекції в разі механічних пошкоджень, градобою, розтріскування стебла.

Характеристики

Вміст діючої речовини **карбендазим, 500 г/л**

Хімічна група **похідні бензимидазолу**

Препаративна форма **концентрат суспензії**

Класифікація ВООЗ **III клас**

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування
Фунгіцид застосовується в період вегетації профілактично або при перших ознаках інфекції для кожної окремо взятої хвороби. Обробку доцільно проводити при температурі в межах +10°C - +25°C.

Сумісність
Сумісний з більшістю продуктів. Однак в кожному конкретному випадку необхідно попередньо перевірити продукти на сумісність.

Вимоги до рН робочого розчину
від 5 до 9

Застереження у застосуванні
Щоб запобігти виникненню резистентності, рекомендується бакова суміш з фунгіцидами різноманітних механізмів дії. Не рекомендується застосовувати продукт більше ніж двічі за сезон. У разі порушення регламенту застосування можливе зниження ефективності продукту.

Норма витрати робочого розчину
200-300 л/га.

Механізм дії

Карбендазим адсорбується листям рослин, швидко транслокується, блокує процеси ділення ядер грибів, затримує проростання спор, скорочує ріст міцелію, завдяки чому забезпечує максимальний захист багатьох культур від грибкових захворювань.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, л / га	Максимальна кількість обробок
Пшениця яра та озима	Борошниста роса, септоріоз, листя	Обприскування в період вегетації	0,5	2
Ячмінь ярий	Борошниста роса, сітчаста та темно-бура плямистості		0,5	2
Соняшник	Сіра гниль, біла гниль, фомоз		1,5	2
Буряки цукрові	Церкоспороз,		0,3-0,4	2
Соя	Церкоспороз, біла та сіра гниль, фузаріоз		0,5-0,7	2
Ріпак озимий	Альтернаріоз, фомоз, борошниста роса		0,6-0,8	2

Для розширення спектру хвороб та їх контролю на озимій пшениці у фазі «кущення», рекомендуємо застосування бакової суміші фунгіцидів Абсолют + Парацельс.

Таке поєднання двох діючих речовин з контактною лікувальною та системною діями дозволить локалізувати поширення хвороб, захистити посіви у період відновлення вегетації та збереже листову поверхню до наступного фунгіцидного обробітку «на початку виходу у трубку».

