



# АКСАКАЛ



**Селективний післясходовий гербіцид системної дії для знищення однорічних дводольних бур'янів, в т. ч. стійких до 2,4 Д**

## Переваги

- Контроль підмаренника чіпкого до 7 кілець, падалиці озимого ріпаку та падалиці соняшника (у т. ч. ІМІ та Експрес ).
- Відсутність фітотоксичності завдяки високій селективності.
- Сумісність з гербіцидами, інсектицидами, фунгіцидами та добривами.
- Придатний до осіннього застосування.

## Характеристики

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Вміст діючої речовини | флорасулам, 250 г/кг             |
| Хімічна група         | триазолпіримідини                |
| Препаративна форма    | гранули, що диспергуються у воді |
| Класифікація ВООЗ     | III клас (помірно небезпечний)   |

## Рекомендації щодо застосування

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Сумісність</b>                     | Можливе використання в бакових сумішах   |
| <b>Вимоги до рН робочого розчину</b>  | від 5 до 7   |
| <b>Застереження у застосуванні</b>    | Малочутливі та перерослі бур'яни можуть не загинути, проте їхній ріст та подальший розвиток значно уповільнюється. |
| <b>Норма витрати робочого розчину</b> | 200-300 л/га.  |



## Механізм дії

Дія флорасуламу полягає у пригніченні ферменту ацеталактатсинтитази, що в свою чергу блокує утворення валіну, ізолейцину і лейцину. У подальшому (протягом 3-х годин після застосування) відбувається зупинка поділу клітин та росту чутливих бур'янів.

## Норми витрат та строки застосування

| Культура, об'єкт, що обробляється | Спектр дії  | Фаза внесення  | Норми витрати, г/га             |
|-----------------------------------|---|--|---------------------------------|
| Озима пшениця                     | Однорічні дводольні, в т. ч. стійкі до 2,4-Д і МЦПА бур'яни | Обприскування посівів, починаючи з фази 2-3 листків до появи прапорцевого листка культури включно. | <b>20-30<br/>+ ПАР<br/>Мачо</b> |
| Кукурудза                         |   | Обприскування посівів у фазі 3-7 листків культури  | <b>20<br/>+ ПАР<br/>Мачо</b>    |

Контролювати падалицю соняшника найкраще гербіцидами, що мають у своєму складі флорасулам. Аксакал ефективно бореться зі всіма видами падалиці соняшнику.

Гербіцид має широке вікно застосування на озимій пшениці (починаючи з 2-3 листків до появи прапорцевого листка).

Є відмінним партнером у бакових сумішах для розширення спектру дії та підсилення контролю слабчутливих дводольних бур'янів.

Оптимальна температура для застосування: від +5 °С до +25 °С.

**Замовити**

**0-800-300-044**  
**+38(044)364-88-41**



Повернутись до  
ГОЛОВНОГО ЗМІСТУ

