

## ДОТ



## Універсальний фунгіцид з відмінною захисною та лікувальною дією

### Переваги

- Відмінно проникає в рослину та швидка дія на збудників хвороб.
- Забезпечує тривалий захист.
- Широкий спектр хвороб, що контролюються.

### Характеристики

Вміст діючої речовини	ципроконазол 80 г/л + пропіконазол 250 г/л
Хімічна група	триазоли
Препаративна форма	концентрат емульсії
Класифікація ВООЗ	III клас (помірно небезпечний)

### Рекомендації щодо застосування

#### Особливості застосування

Фунгіцид застосовується в період вегетації профілактично або при появі перших ознак хвороб. Обробку доцільно проводити при температурі в межах +10°C - +25°C.

#### Сумісність

Сумісний з більшістю пестицидів, що застосовуються на сільськогосподарських культурах. Проте в кожному конкретному випадку необхідно перевіряти продукти на сумісність.

#### Вимоги до рН робочого розчину

від 5 до 8

#### Застереження у застосуванні

У разі порушення регламенту застосування можливе зниження ефективності продукту.

#### Норма витрати робочого розчину

200-300 л/га.



## Механізм дії

Ципроконазол зупиняє розвиток грибів, блокуючи біосинтез стиролів у мембранах клітини, рухається акропетально.

Пропіконазол рухається трансламінарно та має швидкий «стоп-ефект».

## Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, л / га	Максимальна кількість обробок
Озима пшениця	Бура, стеблова та жовта іржа, борошниста роса, септоріоз листя і колосу, фузаріоз колосу	Обприскування в період вегетації	0,4 -0,5	2
Ячмінь	Бура іржа, борошниста роса, плямистості листя			2
Цукрові буряки	Церкоспороз, борошниста роса		0,5	2
Соя	Септоріоз, біла гниль, іржа		0,5	2
Соняшник	Іржа, септоріоз		0,5	2

Для розширення спектру дії на хвороби та підвищення захисного, викорінюючого та лікувального ефекту рекомендується використовувати бакову суміш ДОТ + Старк.

Замовити

0-800-300-044  
+38(044)364-88-41

Повернутись до  
ГОЛОВНОГО ЗМІСТУ

