



САЛЬТО



пшениця



соняшник



цук. буряки



соя



капуста



яблуна



виноградники



Контактно-системний фунгіцид профілактичної та лікувальної дії для захисту від комплексу збудників хвороб рослин



Вміст діючої речовини

тіофанат-метил,
500 г/л



Хімічна група

бензімідазоли



Препаративна форма

концентрат суспензії



Класифікація ВООЗ

III клас
(помірно токсичний)

Має швидку і водночас подовжену захисну дію.

Широкий спектр дії.

Має сильну лікувальну дію та стоп-ефект.

Механізм дії

Завдяки системній дії швидко розподіляється по рослині. Унікально поєднує профілактичну і лікувальну дії, має викорінюючий ефект.



Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Шкодочинний об'єкт	Норма витрати препарату, л/га	Фаза внесення	Максимальна кратність обробки
Пшениця	Борошниста роса, септоріоз, бура іржа, фузаріозна і церкоспорельозна кореневі гнилі	1,2-1,4	Обприскування в період вегетації	2
Соняшник	Фомоз, фомопсис, вертицильоз, склеротиніоз (біла гниль)	1,2-1,4		2
Буряки цукрові	Церкоспороз, борошниста роса	0,8-1,2		3
Соя	Церкоспороз, іржа, борошниста роса	1,0-1,4		2
Капуста	Фузаріозне в'янення, фомоз, борошниста роса, сіра та біла гнилі	1,5-2,0		2
Яблуна	Парша, борошниста роса, моніліоз	1,2-1,6		3
Виноградники	Оїдіум, сіра гниль	1,0-1,5		3

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування

Препарат застосовують шляхом обприскування культур для попередження появи захворювань або за наявності ознак ураження: 1-3 рази на сезон залежно від рівня ураження і погодних умов.

Норма витрати робочого розчину

Для обприскування плодкових культур: 1000-1200 л/га, виноград, 800-1000 л/га, плодіві 200-300 л/га, польові культури.

Сумісність

Гнучкий у змішуванні з іншими препаратами, за винятком лужних препаратів, наприклад, бордоської рідини.

Застереження у застосуванні

У разі порушення регламенту застосування можливе зниження ефективності препарату.

ФУНГІЦИДИ