



САЛЬТО



Системний фунгіцид профілактичної та лікувальної дії для захисту від комплексу збудників хвороб рослин

Переваги

- Має швидку і водночас подовжену захисну дію.
- Широкий спектр дії.
- Має лікувальну та викорінюючу дії.

Характеристики

Вміст діючої речовини	тіофанат-метил, 500 г/л
Хімічна група	бензimidазоли
Препаративна форма	концентрат суспензії
Класифікація ВООЗ	III клас (помірно токсичний)

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування

Продукт застосовують шляхом обприскування культур для попередження появи захворювань або за наявності ознак ураження.

Сумісність

Гнучкий у змішуванні з іншими продуктами, окрім лужних. Не змішувати з мідьвмісними продуктами.

Вимоги до рН робочого розчину

від 5 до 7

Застереження у застосуванні

У разі порушення регламенту застосування можливе зниження ефективності продукту.

Норма витрати робочого розчину

Для польових культур 200-300 л/га, для плодових насаджень 800-1000 л/га, виноградників 600-800 л/га

Механізм дії

Завдяки системній дії тіофанат-метил швидко розподіляється по рослині. Унікально поєднує профілактичну і лікувальну дії, має викорінюючий ефект.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, л / га	Максимальна кількість обробок	Строк очікування після обробки, діб
Пшениця	Борошниста роса, септоріоз, бура іржа, фузаріозна і церкоспорельозна кореневі гнилі	Обприскування в період вегетації	1,2-1,4	2	20
Соняшник	Фомоз, фомопсис, вертицильоз, склеротиніоз (біла гниль)		1,2-1,4	2	20
Буряки цукрові	Церкоспороз, борошниста роса		0,8-1,2	3	20
Соя	Церкоспороз, іржа, борошниста роса		1,0-1,4	2	20
Капуста	Фузаріозне в'янення, фомоз, борошниста роса, сіра та біла гнилі		1,5-2,0	2	14
Яблуна	Парша, борошниста роса, моніліоз		1,2-1,6	3	20
Виноградники	Оїдіум, сіра гниль		1,0-1,5	3	30

Для розширення спектру хвороб та їх контролю рекомендуємо застосування бакової суміші фунгіцидів Сальто + Парацельс.

Таке поєднання двох діючих речовин з контактною лікувальною та системною діями дозволить локалізувати поширення хвороб на не-уражені частини, захистити посіви у період відновлення вегетації та збереже листову поверхню до наступного фунгіцидного обробітку на початку виходу у трубку.

Замовити

0-800-300-044
+38(044)364-88-41

Повернутись до
ГОЛОВНОГО ЗМІСТУ

