



ТАЛЕР



Системний фунгіцид для захисту від комплексу збудників хвороб

Переваги

- Добре виражений «стоп-ефект».
- Володіє захисною, викорінюючою та лікувальною діями.
- Відмінний контроль фузаріозу колосу.
- Проявляє ріст-регулюючу дію на ріпак.

Характеристики

Вміст діючої речовини **тебуконазол, 250 г/л**

Хімічна група **триазоли**

Препаративна форма **концентрат емульсії**

Класифікація ВООЗ **III клас небезпечності**

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування

Фунгіцид застосовується в період вегетації профілактично або при перших симптомах прояву інфекції. Обробку доцільно проводити за температури в межах +10°C - +25°C.

Сумісність

Сумісний з іншими продуктами. Але в будь-якому випадку перед застосуванням рекомендується провести попередній тест на змішуваність.

Вимоги до рН робочого розчину

від 5 до 9

Застереження у застосуванні

У разі порушення регламенту застосування можливе зниження ефективності продукту.

Норма витрати робочого розчину

200-300 л/га



Механізм дії

Тебуконазол інгібує біосинтез ергостерону в клітинах гриба, що призводить до руйнації клітинних стінок патогена, зупинки росту міцелію та його швидкої загибелі.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, л / га	Максимальна кількість обробок
Пшениця	Бура листова іржа, септоріоз, фузаріоз та борошниста роса	Обприскування в період вегетації	0,5-1,0	2
Ріпак	Альтернаріоз, циліндроспоріоз		0,5-1,0	2
Ріпак	Інгібування росту листя		0,5-0,75	2
Соя	Фузаріоз, альтернаріоз, склеротініоз		0,5-1,0	2

Використання фунгіциду Талер підвищує зимостійкість та забезпечує стійкість проти вилягання, сприяє кращому формуванню бічних пагонів. Талер швидко проникає в рослину, за 1-2 години. При цьому зберігає свою ефективність протягом декількох тижнів.



Замовити

0-800-300-044
+38(044)364-88-41

Повернутись до
ГОЛОВНОГО ЗМІСТУ

