



ТЕФУТ ГОЛД



Двокомпонентний інсектицидний протруйник для надійного захисту від ґрунтових і наземних шкідників

Переваги

- Превентивний контроль ґрунтових шкідників ще до безпосереднього їхнього контакту з обробленими рослинами
- Контроль шкідників сходів на ранніх етапах розвитку кукурудзи.

Характеристики

Вміст діючої речовини	тіаметоксам, 200 г/л + тefлутрин, 80 г/л
Хімічна група	неонікотиноїди, піретроїди
Препаративна форма	концентрат, що тече
Класифікація ВООЗ	III клас (помірно небезпечний)

Рекомендації щодо застосування

Застереження у застосуванні

Для забезпечення фумігантної дії потрібна температура від +8 °С – +10 °С. У зв'язку з цим слід уникати висіву насіння кукурудзи в холодний ґрунт або в очікуванні зниження температури ґрунту протягом терміну дії продукту. Крім того, слід дотримуватись агротехнічних умов і строків посіву.

Сумісність

Тefут Голд можна змішувати з іншими загальноживаними продуктами для обробки насіння. Проте в кожному конкретному випадку слід перевіряти продукти на сумісність.

Вимоги до рН робочого розчину

від 5 до 7

Механізм дії

Унікальною особливістю, що відрізняє тefлутрін від всіх інших піретроїдів, є утворення активної газової фракції навколо обробленого насіння. Це газове середовище утворює захисну сферу на відстані 2,0-2,5 см навколо насіння. Таким чином, ґрунтові шкідники гинуть до того, як завдати шкоду насініні, проросткам та кореневій системі. Дія тіаметоксаму на листогризухих і сисних комах – наслідок високої системної активності. Він швидко проникає з поверхні насіння, формуючи високу концентрацію активної речовини в сім'ядолях, і одночасно вивільняється з насіння в ґрунт, звідки поглинається корінням і розподіляється по рослині.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, л/т
Кукурудза	Комплекс ґрунтових шкідників	Обробка насіння перед посівом	5,0-12



Замовити

0-800-300-044
+38(044)364-88-41

Повернутись до
ГОЛОВНОГО ЗМІСТУ

