



ФОРИТ



Гербицид системної дії для боротьби з однорічними та деякими багаторічними дводольними бур'янами, в тому числі стійкими до 2,4-Д

Переваги

- Широке вікно застосування.
- Відсутність фітотоксичної дії.
- Високоєфективний проти берізки польової на всіх етапах її розвитку, підмаренника чіпкого та видів гірчаків.

Характеристики

- Вміст діючої речовини** флуроксипір, 333 г/л
- Хімічна група** похідні піридину
- Препаративна форма** концентрат, що емульгується
- Класифікація ВООЗ** III клас

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування

Продукт контролює тільки ті чутливі види бур'янів, сходи яких були наявні під час обприскування та знаходяться в стадії активної вегетації.

Сумісність

Продукт сумісний з іншими пестицидами, рідкими азотними добривами та регуляторами росту рослин. Перед приготуванням робочого розчину в суміші з іншими продуктами, рекомендується перевірити фізичну змішувальність продуктів у малій ємкості.

Вимоги до рН робочого розчину

від 4 до 7

Норма витрати робочого розчину

200-300 л/га.

Механізм дії

Флуроксипір блокує дію гормону росту рослин (ауксину) та впливає на ростові процеси рослинних клітин та на загальні ростові процеси рослин чутливих видів бур'янів.

Не застосовувати препарат одразу після заморозків чи при очікуванні заморозків у ніч після обробки. Не використовувати препарат, коли посіви перебувають у стресовому стані (посуха, перезволоження ґрунту та ін.). Температура в межах від +8 до +25°C є рекомендованою для використання гербициду. Саме за цих умов рослини бур'янів нормально розвиваються, що сприяє активному проникненню гербициду через листову поверхню та переміщенню до точок росту рослини.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, л/га
Кукурудза	Однорічні (в т.ч. підмаренник чіпкий) та деякі багаторічні (в т.ч. берізка польова) дводольні бур'яни	Обприскування посівів у фазу 3-7 листків у культурі	0,5-0,6
Сорго		Обприскування посівів в період вегетації у фазі 3-7 листків	0,3-0,5
Пшениця		Обприскування від фази кушіння до фази прапорцевого листка у культурі (після появи березки польової)	0,3-0,5

Для знищення вегетуючих злісних бур'янів (берізка польова, види гірчаків, осотів) після збирання культури, в баковій суміші з Форитом можна використовувати Напалм або Напалм Форте. Норми витрати залежать від фітосанітарного стану поля після збирання.

