



# ОКТАНТ ТУРБО

NEW



5L



пшениця



ріпак



соняшник



кукурудза



соя



горох



буяки цукрові

Ефективне поєднання «нокдаун-ефекту» та тривалого періоду захисної дії проти широкого спектру шкідників.



**Вміст діючої речовини**

Тіаметоксам, 141 г/л  
+ лямбда-цигалотрин,  
106 г/л



**Хімічна група**

Неонікотиноїди,  
Піретроїди



**Препаративна форма**

концентрат  
суспензії



**Класифікація ВООЗ**

II клас  
(токсичний)

Надзвичайно тривалий захисний період

Широкий спектр дії

Відсутність резистентності

Зручний і безпечний у бакових сумішах

## Механізм дії

Тіаметоксам, взаємодіючи з нікотин-ацетилхоліновими рецепторами комах, порушує у них передачу нервових імпульсів. У результаті в шкідників починаються конвульсії та параліч, внаслідок чого вони гинуть. Легко поглинається рослинами і рівномірно розподіляється по всіх тканинах, захищаючи навіть необроблені ділянки рослини. Ефективний проти більшості сисних шкідників, які ведуть прихований спосіб життя



## Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Шкочодчинний об'єкт	Фаза внесення	Норми витрати препарату, л/га	Кількість обробок	Строк останньої обробки до збирання врожаю
<b>Пшениця</b>	Клоп шкідлива черепашка, п'явиці, попелиці, трипси	Обприскування в період вегетації	0,20 – 0,25	1-2	30
<b>Ріпак</b>	Хрестоцвіті блішки, клопи, совки, прихованохоботник		0,20 – 0,25	1-2	30
<b>Соняшник</b>	Попелиці, совки		0,20 – 0,25	1-2	30
<b>Кукурудза</b>	Попелиці, совки, лучний метелик	Обприскування в період вегетації в т.ч. авіаметодом.	0,20 – 0,25	1-2	30
<b>Соя</b>	Клопи, совки, акацієва вогнівка	Обприскування в період вегетації	0,20 – 0,25	1-2	30
<b>Горох</b>	Горохова зернівка, горохова плодожерка, попелиці		0,20 – 0,25	1-2	30
<b>Буряки цукрові</b>	Бурякові блішки, довгоносики, щитоноски, попелиці		0,20 – 0,25	1-2	30

## Рекомендації щодо застосування

### Особливості застосування

Оптимальна температура для застосування +8 - +25 оС.

### Вимоги до рН робочого розчину

від 5 до 7

### Норма витрати робочого розчину

200-300 л/га

### Сумісність

Продукт сумісний з іншими препаратами. Але перед застосуванням рекомендується провести попередній тест на змішувальність.

### Застереження у застосуванні

Не застосовувати за екстремальних погодних умов, коли шкідники знаходяться у стресовому стані. Не застосовувати препарат пізніше зазначеного у таблиці строку останньої обробки до збирання врожаю.