




КІТЧ



Двокомпонентний фунгіцид, має високу ефективність проти широкого спектру хвороб плодів та ягід

Переваги

- Широкий спектр та ефективний контроль збудників, які спричиняють гнилі плодів та ягід.
- Короткий термін очікування.
- Покращує лежкість плодів під час зберігання.

Характеристики

- Вміст діючої речовини** ципродініл, 375 г/кг + флудіоксаніл, 250 г/кг
- Хімічна група** анілінопіримідини
- Препаративна форма** гранули, що диспергуються у воді
- Класифікація ВООЗ** III клас

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування

Рекомендується дотримуватись регламенту приготування робочого розчину для вододисперсних гранул.

Сумісність

Сумісний з іншими продуктами. Перед застосуванням рекомендується провести попередній тест на змішуваність.

Вимоги до рН робочого розчину

від 5 до 9

Застереження у застосуванні

Не застосовувати продукт пізніше зазначеного у таблиці строку останньої обробки до збирання врожаю.

Норма витрати робочого розчину


Для польових культур 200-300 л/га, для плодових насаджень 800-1200 л/га, виноградників 600-800 л/га

Механізм дії

Ципродініл діє на чотирьох етапах розвитку патогена, забезпечуючи захист від його проникнення в клітину. Після застосування ципродініл та флудіоксаніл залишаються в кутикулярному шарі плодів, захищаючи від поширення патогена по її тканинах, швидко проникає в тканини рослини і перерозподіляється трансламінарно. Дія продукту починає проявлятися через 2-3 години після застосування.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, кг / га	Максимальна кількість обробок
Яблуна, слива, черешня	Хвороби плодів під час зберігання у сховищах	Обприскування в період вегетації	0,75 - 1,0	2
Слива, черешня	Моніліоз, сиза пліснява, гниль, фузаріозна гниль, альтернаріоз, сіра гниль			2
Виноградники	Сіра гниль			2
Томати (відкритого та закритого ґрунту)	Хвороби при зберіганні (альтернаріоз, антракноз, фузаріоз, мокра та сіра гнилі)			2
Суниця	Сіра гниль ягід, бура і біла плямистість листя, борошниста роса			2
Лохина	Антракноз, моніліоз ягід, пеніциліозна та сіра гнилі, фомоз			2
Морква	Альтернаріоз, склеротініоз			2
Малина, ожина	Сіра гниль			2



Без обробок



Кітч

Найбільш поширеною хворобою є сіра гниль, адже саме вона викликає загнивання ягід.

Збудник - грибок, Botrytis. Хвороба розвивається при вологій погоді, в результаті чого ягоди загнивають.

