



БОМБАРДИР ДУО

NEW

пшениця



ріпак



соняшник



кукурудза



СОЯ



буряки цукрові



Двокомпонентний інсектицид для боротьби з широким спектром гризучих і сисних шкідників.



Вміст діючої речовини

імідаклоприд, 300 г/л
+ лямбда-цигалотрин,
100 г/л



Хімічна група

неонікотинοїди,
піретроїди



Препаративна форма

концентрат
суспензії



Класифікація ВООЗ

III клас
(помірно токсичний)

Відмінна системна дія

Широке вікно застосування

Швидка дія

Тривалий захисний період

Механізм дії

Інсектицид на основі імідаклоприду, завдяки своїм контактнo-кишковим властивостям, викликає ураження нервової системи дорослих комах та їх личинок, подразнення їх рецепторів, конвульсії та швидку загибель. Препарат проникає в усі частини рослини через листя, стебла, коріння та переноситься по них акропетально. Імідаклоприд діє як антагоніст постсинаптичних нікотинοвих рецепторів, з послідуємим руйнуванням центральної нервової системи комах, внаслідок чого шкідники гинуть. При відносно низьких нормах застосування стримує чисельність комах впродовж тривалого періоду (в більшості випадків достатньо однієї обробки за сезон).



Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Шкочочинний об'єкт	Фаза внесення	Норми витрати препарату, л/га	Кількість обробок	Строк останньої обробки до збирання врожаю
Пшениця	Клоп шкідлива черепашка, п'явиці, попелиці, трипси, хлібні жуки, злакові мухи	Обприскування в період вегетації	0,15 – 0,25	1-2	30
Ріпак	Хрестоцвіті блішки, клопи, совки, прихованохоботник, ріпаковий квіткоїд		0,15 – 0,25	1-2	30
Соняшник	Попелиці, совки		0,15 – 0,25	1-2	30
Кукурудза	Попелиці, совки, стебловий метелик		0,15 – 0,25	1-2	30
Соя	Клопи, совки, білани, акацієва вогнівка		0,15 – 0,25	1-2	30
Буряки цукрові	Бурякові блішки, довгоносики, щитоноски, попелиці		0,15 – 0,25	1-2	20

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування

Оптимальна температура для застосування +15 - +25 оС.

Норма витрати робочого розчину

200-300 л/га

Вимоги до рН робочого розчину

від 5 до 7

Сумісність

Продукт сумісний з іншими препаратами. Рекомендується провести попередній тест на змішуваність.

Застереження у застосуванні

Токсичний для бджіл.