



КАМЗОЛ ТУРБО



Комбінований системний фунгіцид захисної та лікувальної дії

Переваги

- Широкий спектр дії: пригнічує основні хвороби культур.
- Швидко проникає в рослину та забезпечує відмінну дію продукту.
- Широке вікно застосування.

Характеристики

Вміст діючої речовини	ципроконазол, 80 г/л + метконазол, 60 г/л
Хімічна група	триазоли
Препаративна форма	концентрат емульсії
Класифікація ВООЗ	III клас (помірно небезпечний)

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування

Обприскування слід проводити за температури повітря в межах від +10°C до +25°C та швидкості вітру не вище 3 м/сек при дрібнокрапельному і 4 м/сек при крупнокрапельному обприскуванні.

Сумісність

Продукт можна використовувати в бакових сумішах з більшістю пестицидів. Однак перед цим необхідно провести пробне змішування.

Вимоги до рН робочого розчину Норма витрати робочого розчину

Від 4 до 9

200-300 л/га.



Механізм дії

Ципроконазол зупиняє розвиток грибів, блокуючи біосинтез стиролів у мембранах клітини, рухається акропетально.

Механізм дії метконазолу заснований на інгібуванні біосинтезу ергостерину, порушенні біосинтезу клітинних мембран гриба. Метконазол швидко проникає в рослину і розподіляється в ній акропетально.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, л / га	Максимальна кількість обробок
Пшениця	Фузаріоз, септоріоз, іржа, альтернаріоз, борошниста роса	Обприскування в період вегетації	0,5-0,7	2
Ячмінь озимий та ярий	Фузаріоз, септоріоз, іржа, альтернаріоз, борошниста роса, сітчаста плямистість, ринхоспоріоз		0,5-0,7	2
Ріпак	Фомоз, альтернаріоз		0,5-0,7	2
Соняшник	Іржа, борошниста роса, альтернаріоз		0,5-0,7	2
Соя	Іржа, фузаріоз, септоріоз, борошниста роса, альтернаріоз		0,5-0,7	2

[Замовити](#)

0-800-300-044
+38(044)364-88-41

Повернутись до
ГОЛОВНОГО ЗМІСТУ

