



СПЛІТ



Системний фунгіцид з профілактичною та лікувальною діями

Переваги

- Швидке проникнення у тканини рослин та стійкий до змивання опадами.
- Чітко виражена системна дія.
- Має швидкий стоп – ефект.
- Відзначається вираженим позитивним фізіологічним впливом на рослину.

Характеристики

Вміст діючої речовини	дифеноконазол 250 г/л
Хімічна група	триазоли
Препаративна форма	концентрат емульсії
Класифікація ВООЗ	III клас (помірно небезпечний)

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування

Фунгіцид застосовується в період вегетації профілактично або при перших симптомах прояву інфекції. Обробку доцільно проводити при температурі в межах +10°C - +25°C.

Сумісність

Продукт можна використовувати в бакових сумішах із гербіцидами та фунгіцидами, однак перед цим рекомендовано провести пробне змішування.

Вимоги до рН робочого розчину

від 5 до 8

Застереження у застосуванні

У разі недотримання регламенту застосування можливе зниження ефективності продукту.

Норма витрати робочого розчину

200-300 л/га



Механізм дії

Дифеноконазол проникає в тканини рослини, повністю інгібує ріст субкутикулярного міцелію, знижує рівень спороношення патогена. Дифеноконазол інгібує біосинтез ергостерину в клітинах гриба, що призводить до руйнації клітинних сіток патогена, зупинці росту міцелію та його швидкій загибелі.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, л / га	Максимальна кількість обробок
Пшениця озима	Септоріоз, іржа	Обприскування в період вегетації	0,2-0,4	2
Соняшник	Альтернаріоз, фомоз, іржа, септоріоз			2
Цукровий буряк, соя*	Борошниста роса, церкоспоров		0,5	2

*Очікуємо на реєстрацію

Для розширення спектру дії на хвороби та підвищення захисного, викорінюючого та лікувального ефекту рекомендується використовувати у бакових сумішах з фунгіцидами Старк або Меценат.



Спліт + Меценат

Замовити

0-800-300-044
+38(044)364-88-41

Повернутись до
ГОЛОВНОГО ЗМІСТУ

