



БАНТЕН



Селективний контактний післясходовий гербіцид для контролю однорічних широколистих бур'янів, в т. ч. стійких до 2М-4Х



Вміст діючої речовини

бентазон,
480 г/л



Хімічна група

похідна
тіадіазинів



Препаративна форма

розчинний
концентрат



Класифікація ВООЗ

III клас
(помірно
небезпечний)

Препарат не впливає на наступні культури сівозміни.

Ефективний контроль однорічних дводольних, в тому числі стійких до 2,4-Д і 2М-4Х.


Можливе застосування: зернові (ячмінь, пшениця), зернові з підсівом (конюшина, люцерна), бобові (конюшина, люцерна), зернобобові (со́я, горо́х).

Механізм дії

Бентазон має виражену контактну дію і поглинається переважно зеленими частинами рослин. Діюча речовина порушує процес фотосинтезу. Відмирання бур'янів проявляється через 3-5 днів за оптимальних умов.



Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати препарату, л/га	Кратність обробок
 Соя	Однорічні дводольні бур'яни	Обприскування у фазі 1-3 трійчастих листків культури	1,5-3,0	1
 Горох		Обприскування у фазі 5-6 листків культури	2,0-3,0	1

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування	Норма витрати робочого розчину	Сумісність	Застереження у застосуванні
Рекомендоване застосування в ранковий час за відсутності роси	250-300 л/га	Можливе використання в бакових сумішах (див. таблицю змішування в кінці)	Можливе зниження ефективності за похмурої погоди