



ЛІТЕРОН



Ґрунтовий досходовий гербіцид системної дії для контролю однорічних злакових та деяких дводольних бур'янів.

Переваги

- Відмінний контроль однорічних злакових бур'янів.
- Тривала захисна дія
- Відсутність фітотоксичної дії на культури
- Ідеальний партнер для бакових сумішей

Характеристики

Вміст діючої речовини S-метолахлор, 960 г/л

Хімічна група хлорацетаміди

Препаративна форма концентрат емульсії

Класифікація ВООЗ III клас

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування При внесенні продукту ґрунт повинен мати дрібногрудкувату структуру та достатню кількість вологи, з мінімальними залишками рослинних решток.

Сумісність Можливе використання в бакових сумішах.

Вимоги до рН робочого розчину від 6 до 8

Застереження у застосуванні Ефективність продукту знижується за умови недостатнього зволоження та пониження температури нижче +5 °С.

Норма витрати робочого розчину 200-300 л/га.

Механізм дії

Діюча речовина препарату швидко адсорбується головним чином через кореневу систему проростків бур'янів, що призводить до зупинення поділу клітин і відмирання проростків та молодих рослин бур'янів.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, л/га
Кукурудза, соняшник, соя, цукрові буряки	Однорічні злакові та деякі дводольні бур'яни	Обприскування ґрунту до появи сходів культури	1,0 - 1,6
Горох, ріпак, кавуни		Обприскування ґрунту до висівання або до появи сходів культури (у зонах недостатнього зволоження – із за гортанням)	1,6
Сорго*		Обприскування у фазу 3–5 листків культури.	1,6 - 2,0
Картопля		Обприскування ґрунту до посадки, або до появи сходів культури	1,6

* Обов'язкова обробка насіння сорго антидотом!

Для запобігання скочування крапель та досягнення більш рівномірного покриття поверхні поля, створення ефективного "гербіцидного екрану" рекомендовано використовувати з ПАР СУПЕР МАЧО з нормою 0,1 л/га або МАЧО з нормою 0,2 л/га

