



# ПРОСТАФ



**Трансламінарний інсектицид, спрямований на надійний контроль приховано та відкрито живучих лускокрилих шкідників**

## Переваги

- Починає свою дію вже на стадії яєць, маючи прямий овіцидний ефект
- Проникаючи в рослину, утворює резервуари з діючою речовиною і залишається стійким до змивання дощем вже через дві години
- Ефективність препарату не залежить від високих температур повітря та кислотності робочого розчину

## Характеристики

**Вміст діючої речовини** емабектин бензоат 100 г/кг

**Хімічна група** авермектини

**Препаративна форма** водорозчинні гранули

**Класифікація ВООЗ** II клас

## Рекомендації щодо застосування

### Особливості застосування

Роботи найкраще проводити в ранковий час (до 10 години) та вечірні години (18-22 години), при відсутності вітру або при його низькій швидкості (не більше 3 м/с). Оптимальна температура для застосування становить від +10 до +25°C.

### Сумісність

Продукт сумісний з іншими препаратами в тому числі з біозахистом. Рекомендується провести попередній тест на змішуваність.

### Застереження у застосуванні

Не застосовувати в баковій суміші з хлороталонілом та фунгіцидами на основі фосетилу алюмінію, рідкими мінеральними добривами. Особливо небезпечний для бджіл.

### Вимоги до рН робочого розчину

від 5 до 8

### Норма витрати робочого розчину

250-300 л/га



## Механізм дії

Емафектин бензоат має контактну та кишкову активність. При потраплянні на шкідника блокується центральна нервова система, м'язові клітини не скорочуються, через 1-3 години гусениці перестають харчуватися і через 1-2 доби гинуть. При потраплянні на яйцекладку діюча речовина проникає через оболонку яйця і личинка гине.

## Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, кг/га	Максимальна кількість обробок	Строк останньої обробки до збирання врожаю
<b>Ріпак озимий</b>	Капустяна міль, хрестоцвіті блішки, попелиці, совки	Обприскування в період вегетації	<b>0,2-0,25</b>	2	-
<b>Соняшник</b>	Попелиці, вогнівки, бавовникова совка, соняшникова шипоноска		<b>0,2-0,25</b>	2	-
<b>Кукурудза</b>	Кукурудзяний метелик, бавовникова совка Препарат не контролює личинок, що проникли в качани кукурудзи.		<b>0,2-0,25</b>	2	-

\*Очікуємо на реєстрацію

Замовити

**0-800-300-044**  
**+38(044)364-88-41**

Повернутись до  
ГОЛОВНОГО ЗМІСТУ

