



NEW

РАДИКАЛ



Системний фунгіцид захисної та лікувальної дії на посівах ріпаку, соняшнику, сої та винограду

Переваги

- Має довготривалу дію.
- Ефективна дія проти сірої гнилі.
- Застосовується як для запобігання масовому розвитку хвороби, так і при масовому поширенні хвороби (має лікувальну дію).

Характеристики

Вміст діючої речовини	боскалід, 500 г/кг
Хімічна група	похідні групи аніліди
Препаративна форма	водорозчинні гранули
Класифікація ВООЗ	III клас

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування

Обприскування слід здійснювати в безвітряну погоду (до 5 м/с) при температурі від +10°C до +25°C. Бажано проводити обробки в ранкові або вечірні години

Сумісність

Продукт сумісний з іншими препаратами. Рекомендується провести попередній тест на змішуваність

Вимоги до рН робочого розчину

від 6 до 8

Застереження у застосуванні

Не рекомендується внесення препарату на рослини, які знаходяться в стані стресу

Норма витрати робочого розчину

200-300 л/га

Механізм дії

Боскалід, належить до хімічного класу анілідів, має унікальний механізм дії, який відрізняється від інших фунгіцидів. Він інгібує мітохондріальний дихальний ланцюг грибів Botrytis cinerea, блокуючи синтез АТФ – основного джерела енергії клітини. Завдяки системній дії, боскалід розподіляється по всій рослині, забезпечуючи тривалий захист від інфекції.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, кг/га	Максимальна кількість обробок
Ріпак	Фомоз, альтернаріоз, сіра гниль, склеротиніоз, циліндроспоріоз	Обприскування в період вегетації	0,2-0,3	2
Соняшник	Фомоз, альтернаріоз, біла та сіра гниль, склеротиніоз, іржа			
Соя	Антракноз, септоріоз, склеротиніоз, іржа			
Виноград	Сіра гниль		1,0-1,2	1

