



NEW

РАДИКАЛ НЕО



Двокомпонентний фунгіцид для захисту ріпаку, сої, цукрових буряків та соняшнику від основних хвороб

Переваги

- Ефективна дія на широкий спектр патогенів.
- Тривалий захисний ефект.
- Відсутність резистентності.

Характеристики

Вміст діючої речовини азоксистробін, 250 г/л + боскалід, 150 г/л

Хімічна група стробілурини, похідні групи аніліди

Препаративна форма концентрат суспензії

Класифікація ВООЗ III клас

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування Обприскування необхідно проводити при перших ознаках хвороби або для профілактики

Сумісність Продукт сумісний з іншими препаратами. Рекомендується провести попередній тест на змішуваність

Вимоги до рН робочого розчину від 6 до 8

Застереження у застосуванні Не рекомендується внесення препарату на рослини, які знаходяться в стані стресу або впливу високих температур

Норма витрати робочого розчину 200-400 л/га

Механізм дії

Азоксистробін блокує дихання в клітинах патогенів, забезпечуючи тривалий захисний ефект. Він підвищує засвоєння азоту рослинами, знижує споживання води та подовжує вегетацію, уповільнюючи вироблення етилену. Боскалід частково поглинається рослинами, поширюється по їхніх тканинах і порушує обмін речовин у клітинах патогенів.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, л / га	Максимальна кількість обробок
Соняшник	Альтернاریоз, фомоз, септоріоз, фомопсис, іржа, пероноспороz, борошниста роса	Обприскування в період вегетації	0,7- 0,8	1
Ріпак	Альтернاریоз, фомоз, пероноспороz, біла та сіра гнилі			
Цукрові буряки	Борошниста роса, пероноспороz, церкоспороz			
Соя	Пероноспороz, борошниста роса, фузаріоз, іржа		0,4-0,6	2

