



NEW

ХАРУМА МАКС

COMING
SOON



Селективний післясходовий гербіцид для боротьби з однорічними та багаторічними злаковими бур'янами на посівах сільськогосподарських культур

Переваги

- Відсутність обмежень на наступні культури.
- Ефективна боротьба з широким спектром злакових бур'янів.
- Швидке поглинання гербіциду в нормальних умовах (протягом годин), яке не потребує повторного обприскування.
- Висока ефективність в боротьбі з падалицею пшениці.

Характеристики

Вміст діючої речовини	хізалофоп-П-етил, 150 г/л
Хімічна група	Похідні арилоксифено-ксіпропіонової кислоти
Препаративна форма	концентрат емульсії
Класифікація ВООЗ	III клас

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування

Обприскування проводять у фазі активної вегетації бур'янів за умови температури повітря не нижче +15°C та оптимальної вологості ґрунту, що забезпечує ефективне проникнення і транслокацію діючої речовини в рослині. Обприскування необхідно проводити на ранніх стадіях росту бур'янів: для однорічних - 2-3 листки, а для багаторічних – 4-6 листків (висота близько 10-15 см). На більш пізніх фазах норму витрати препарату слід збільшувати.

Сумісність

Сумісний з більшістю препаратів при обробці культур за тиждень до або після використання грамініцида.

Вимоги до рН робочого розчину

від 7 до 9

Застереження у застосуванні

Уникати змішування з іншими страховими гербіцидами, мікро- та макро добривами.

Норма витрати робочого розчину

200-300 л/га.

Механізм дії

Препарат, потрапляючи на листя бур'янів, швидко проникає всередину рослинних тканин і переміщується до точок росту, коренів та кореневищ. Порушуючи процес фотосинтезу, гербіцид припиняє вироблення рослиною необхідних для життя речовин. В результаті, бур'яни втрачають здатність до росту, набувають характерного червонуватого забарвлення, в'януть і гинуть.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, л/га	Максимальна кількість обробок
Ріпак, цукровий буряк	Однорічні злакові бур'яни	Обприскування в період вегетації культури (у фазі бур'янів 2-4 листків)	0,4-1,0	1
	Багаторічні злакові бур'яни	Обприскування в період вегетації культури (при висоті бур'янів 10-15 см)		1
Соя	Однорічні злакові бур'яни	Обприскування в період вегетації культури (у фазі бур'янів 2-4 листків)	0,4-1,0	1
	Багаторічні злакові бур'яни	Обприскування в період вегетації культури (при висоті бур'янів 10-15 см)		1
Соняшник	Однорічні та багаторічні злакові бур'яни	Обприскування посівів у фазі до 8 справжніх листків культури	0,4-1,0	1
Льон	Однорічні та багаторічні злакові бур'яни	Обприскування в період вегетації культури	0,4-1,0	1

