



БЛЕЙД



Системний післясходовий грамініцид

Переваги

- Швидке проникнення в злакові бур'яни.
- Висока стійкість до змивання опадами.
- Швидкий візуальний ефект дії препарату.
- Знищення як наземної, так і підземної частини злакових бур'янів.

Характеристики

Вміст діючої речовини **клетодим, 120 г/л**

Хімічна група **циклогександіони**

Препаративна форма **концентрат емульсії**

Класифікація ВООЗ **III клас (помірно небезпечний)**

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування

Норму використання продукту встановлюють залежно від фази розвитку бур'янів та ступеня забур'яненості. Обробку доцільно проводити у ранкові години при температурі від 10 до +25°C.

Сумісність

Не рекомендовано змішувати з фосфорорганічними інсектицидами, гербіцидами проти дводольних бур'янів та добривами.

Вимоги до рН робочого розчину

від 7 до 9

Застереження у застосуванні

Боротьбу із злаковими бур'янами, рекомендуємо провести до фази 6 листків у соняшнику (ВВСН 16), та до появи квіткових бутонів у сої та ріпаку (ВВСН 50)

Норма витрати робочого розчину

200-300 л/га.



Механізм дії

Клетодим при поглинанні листям і стеблами бур'янів, проникає в рослину, концентрується в точках росту і блокує біосинтез ліпідів. У дводольних рослин клетодим включається в обмін речовин та інактивується. Клетодим знищує як надземну, так і підземну (кореневу) частину злаків, запобігаючи відростанню багаторічних видів. Завдяки своїй селективності продукт не викликає фітотоксичності у дводольних культурних рослин, на яких рекомендований до застосування. Дія клетодиму на злакові бур'яни проявляється на 3-5 день у вигляді хлорозу листків та побуріння точок росту, відмирання рослин відбувається через 7-21 день після обробки.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, л/га
Соняшник, соя, ріпак, буряки цукрові	Однорічні злакові бур'яни	Обприскування бур'янів у фазі 2-3 листків	0,4-0,8
Соняшник, соя, ріпак, буряки цукрові	Багаторічні злакові бур'яни (у т.ч. падалиця озимої пшениці)	Обприскування за висоти бур'янів 10-15 см (у т.ч. до фази кущення падалиці озимої пшениці)	1,4-1,8



Падалиця озимої пшениці у посіві озимого ріпаку



Контроль падалиці озимої пшениці

