



ПЕРУН

соняшник



горох



морква



Селективний ґрунтовий гербіцид для захисту від однорічних дводольних та злакових бур'янів

Переваги

- Ефективно контролює однорічні дводольні бур'яни. Максимальний контроль гірчиці польової та редьки дикої.
- Довготривала захисна дія – 10-12 тижнів (залежно від погодних умов).
- Ідеальний партнер для бакових сумішей з іншими ґрунтовими гербіцидами.
- Не фітотоксичний

Характеристики

Вміст діючої речовини **прометрин, 500 г/л**

Хімічна група **триазини**

Препаративна форма **концентрат суспензії**

Класифікація ВООЗ **II клас**

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування

Норма витрати продукту залежить від механічного складу ґрунту та вмісту гумусу. На легких ґрунтах застосовуються мінімальні норми, на важких (високогумусних) збільшується норма витрати до максимальної.

Сумісність

Ідеальний партнер для бакових сумішей. Сумісний з більшістю продуктів. Застосовується разом з іншими ґрунтовими гербіцидами для розширення спектру дії (ацетохлор, метолахлор, пропізохлор). Однак у приготуванні бакової суміші слід провести пробне випробування на сумісність

Вимоги до pH робочого розчину

6-7

Застереження у застосуванні

Після застосування продукту не рекомендовано проводити міжрядні обробітки, оскільки це може зменшити гербіцидну дію.

Норма витрати робочого розчину

200-300 л/га.



Механізм дії

Прометрин поглинається як проростками, так і корінням проростаючих бур'янів при застосуванні продукту до їхніх сходів. На бур'яни, що зійшли, прометрин діє через листя. Ефективність досягається завдяки здатності прометрину блокувати процес фотосинтезу бур'янів.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, л/га	Максимальна кількість обробок	Строк останньої обробки до збирання врожаю
Соняшник	Однорічні дводольні та злакові бур'яни	Обприскування ґрунту до посіву, одночасно з висіванням або до появи сходів культури	2,0-4,0	1	-
Горох		Обприскування ґрунту до висівання, до появи сходів або у фазі 2-х справжніх листків культури	3,0-5,0	1	-
Морква		Обприскування ґрунту до висівання, до появи сходів або у фазі 2-х справжніх листків культури	2,0-3,0	1	120

Для покращення синергічної дії проти дводольних бур'янів та однорічних злакових на соняшнику в системі ґрунтового внесення (в залежності від ґрунтово-кліматичних умов) рекомендована наступні бакові суміші : Перун + Сора-Нет, Перун + Дабл Трай

