ТИРАНА

для картоплі

для оз. зернових

для оз. ріпаку

Протруйник для захисту картоплі, озимих зернових культур та озимого ріпаку інсектицидно-фунгіцидної дії

Вміст діючої речовини
імідаклоприд, 280 г/л, тіабендазол, 80 г/л

Хімічна група
неонікотиноїди, бензимідазоли

Препаративна формула
концентрат суспензії

Класифікація ВООЗ
IIII клас (високо-токсичний)

Переваги продукту

- Надійний захист картоплі від колорадських жуків, ґрунтових шкідників та деяких грибкових хвороб з початку вегетації культури.
- Не шкідливий для бджіл та навколишнього середовища.
- Покращує якість та тривалість зберігання бульб картоплі.
- Світовий досвід використання при протруєнні насіння озимих зернових культур та озимого ріпаку.

Механізм дії

Завдяки яскраво вираженій системній дії, імідаклоприд та тіабендазол рівномірно розподіляються по всім вегетуючим органам рослини, забезпечуючи їх надійний захист від шкідників та хвороб впродовж тривалого періоду.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Шкодочинний об'єкт	Спосіб та строки застосування	Норми витрати препарату	Кратність обробок
Картопля	Комплекс шкідливих комах (колорадський жук, дротяники, несправжньодротяники, гусениці совки, личинки капустянки та хрущів, попелиці та трипси)	Протруювання бульб суспензією препарату (10-15 л води на 1 тонну бульб) за 1-20 днів до висадки	0,5 л/т	1
	Комплекс хвороб (звичайна парша, ризоктоніоз (чорна парша))			

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування

Робочий розчин необхідно використати протягом декількох годин після приготування. Можливо застосовувати завчасно (за 2-3 тижні), а також безпосередньо перед посівом.

Норма витрати робочого розчину

10-15 л/т

Сумісність

Сумісний з іншими засобами захисту рослин, мікроелементами, регуляторами росту. Однак у кожному конкретному випадку, перед приготуванням бакової суміші, слід провести пробне випробування на сумісність.