



ТВІКС



Інсектицид широкого спектру застосування, контактнo-кишкoвої, фумігaнтної, лoкaльнo-систeмної та репелeнтної дії

Переваги

- Має контактну, фумігaнтну, лoкaльнo-систeмну та репелeнтну дію.
- Діє на дорослих комах та личинок.
- Викликає швидку загибель шкідників недовзі після застосування.

Характеристики

Вміст діючої речовини	хлoрпiрифос, 500 г/л + ципeрмeтрин, 50 г/л
Хімічна група	фосфopopгaнічні сполуки, пірeтрoїди
Препаративна форма	кoнцeнтpaт eмyльсії
Класифікація BOOЗ	II клас (високотоксичний)

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування

Обробку проводять у випадку, коли чисельність шкідників перевищує економічний поріг шкодо-чинності. Рівномірне покриття рослин робочим розчином є однією з основних вимог. Оптимальна температура застосування + 15°C - + 25°C

Сумісність

Не рекомендується змішувати з гербіцидами та фунгіцидами.

Застереження у застосуванні

Обробки під час цвітіння культури заборонено.

Вимоги до рН робочого розчину

від 5 до 7

Норма витрати робочого розчину

200-300 л/га

Механізм дії

Механізм дії хлорпірифосу пов'язаний з порушенням процесу обміну іонів натрію та калію, деполяризацією мембрани, пригніченням активності ферменту ацетилхолінестерази. І, як наслідок, порушення нормального проходження нервових імпульсів, розвиток судомної активності м'язів, що переходить у параліч. Завдяки синергічному ефекту двох діючих речовин продукт має стабільно високу ефективність та пролонговану дію.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, л/га	Максимальна кількість обробок
Пшениця яра	Комплекс шкідників	Обприскування в період вегетації	0,75-1,0	1
Пшениця озима			0,75-1,1	1
Ячмінь			0,5-0,75	1
Цукрові буряки	Бурякові довгоносики, щитовоски		0,8	2
Ріпак озимий	Хрестоцвітні блішки, клопи, совки, ріпаковий квіткоїд		1,0-1,1	2



Озима совка - один із найнебезпечніших шкідників сільськогосподарських культур. Гусениці загрожують озимим культурам, цукровому буряку, кукурудзі, соняшнику, ріпаку, сої, овочевим культурам! У фазу появи сходів гусениці підгризають паростки рослин на рівні ґрунту. Стебло або рослина цілком гине.

Шкодочинність озимої совки досить відчутна – за ніч одна гусениця може знищити 10-15 рослин. Загалом втрати врожаю через цього шкідника можуть сягати більше 50%!

Найбільш ефективна боротьба зі шкідником, коли його застосовують проти гусениць молодшого віку. Не слід забувати про те, що гусениці ведуть прихований спосіб життя і виходять харчуватися переважно вночі. Для боротьби із озимою совкою найбільш ефективним є внесення інсектициду Твікс у вечірні години.

Замовити

0-800-300-044
+38(044)364-88-41

Повернутись до
ГОЛОВНОГО ЗМІСТУ

